



Texto y foto. **Aurelio García Blanco**

***Cheimonophyllum candidissimum*** (Berk. & M.A. Curtis) Singer

**Sombrero.** De 1,5-2 cm de diámetro, con aspecto pleurotoide, reniforme o conchoide. Margen incurvado. Cutícula seca, lampiña, lisa, no estriada por transparencia, no higrófana, de color blanco nívoo o cándido, de joven, en la vejez, de color algo cremoso.

**Láminas.** Convergentes hacia un punto lateral donde se unen al pie, de aspecto céreo, blancas al principio, después, al envejecer, algo cremosas. **Pie.** Muy corto, casi inexistente, lateral, con la superficie ornamentada por pequeñas bandas o granulaciones alargadas.

**Carne.** Blanca. **Olor.** Inodoro. **Sabor.** Poco apreciable.

**Esporas.** Globulosas o anchamente elipsoidales, de 5-6  $\mu\text{m}$ , lisas, hialinas, no amiloides. Esporada blanca.

**Hábitat.** Fructifica sobre madera muerta de planifolios, muy raro en coníferas, como es el caso de esta publicación. Solitario o en pequeños grupos. **Época de fructificación.** Otoño. Muy raro y apenas citado en la bibliografía nacional.

**Comestibilidad.** No comestible. No se conocen experiencias sobre su comestibilidad, así que por prudencia, y por protección, dada su rareza, desaconsejamos su consumo.

**Observaciones.** Al observarle por primera vez, nos recuerda a especies del género *Crepidotus*, sobre todo cuando son jóvenes y las láminas son aún blancas. Sin embargo, el grosor de sus láminas de aspecto céreo y el color blanco cándido, además, por supuesto, de la microscopía, los diferencian claramente.

Fecha publicación, 30 de enero de 2012