



Foto. **José Luis Alonso Ortega**. Texto. **Aurelio García Blanco**

***Clavaria fumosa*** Pers.

**Basidioma.** En forma de ramificaciones erectas, con numerosos ejemplares unidos de forma fasciculada, a modo de clavos fusiformes o cilíndricos, a veces, aplanadas con el centro comprimido longitudinalmente, con el ápice estrecho, casi en punta redondeada, con la superficie lisa; muy frágiles y quebradizas, de 3-10 x 0,3-0,7 cm, interiormente huecas; de color ocre-grisáceo, a ocre pálido, con las puntas, de color casi negro, cuando ya son muy adultas o se van desecando. **Carne.** Blanquecina, muy quebradiza. **Olor.** Inodoro. **Sabor.** Poco apreciable.

**Esporas.** Elipsoidales, apiculadas, de 5-7 x 3-4  $\mu\text{m}$ , hialinas, lisas, con contenido granuloso. Esporada blanca.

**Hábitat.** Crece entre la hierba de los pastizales, campos, o en las zonas herbosas de los linderos de los bosques. **Época de fructificación.** Otoño. Muy rara y poco citada.

**Comestibilidad.** Sin interés culinario.

**Observaciones.** Por su crecimiento fasciculado y su color ocre-grisáceo, pensamos que es una especie fácil de identificar. Las que más se le parecen como *C. acuta*, no crece fasciculada, es de menor tamaño y sus esporas son de unas medias de hasta 7-10  $\mu\text{m}$  de longitud, y *C. vermicularis*, tampoco crece de forma fasciculada, es de color totalmente blanco y sus esporas son casi ovaladas, de hasta 5-9  $\mu\text{m}$  de longitud.

Fecha de publicación, 17 de Febrero de 2012.