



Foto. **Guillermo Martínez Fernández**. Texto. **Aurelio García Blanco**

***Coprinospora phlyctidospora*** (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

**Sombrero.** De 1-3 cm de diámetro cuando ya está abierto, al principio de forma cilíndrico-ovoide, después abierto en forma de sombrilla con los bordes levantados hacia arriba; delicuescente. Cutícula de color gris oscuro, cubierta de flocones fibrilosos blancos, más visibles cuando la seta es joven. **Láminas.** Libres, blancas al principio, después, grises y finalmente negras, delicuescentes. **Pie.** De 5-8 x 0,3-0,4 cm, cilíndrico, blanco, cubierto todo él por flocones blancos. **Carne.** Casi inexistente. **Olor.** Nulo. **Sabor.** Nulo.

**Esporas.** Elipsoidales a ovoides, de 8-11 x 6-8  $\mu\text{m}$ , marrón negruzcas, con verrugas muy densas que prácticamente tapan la visión del poro germinativo, que es apical y central. Esporada negra.

**Hábitat.** Es una seta de comportamiento pirófilo. En este caso crecía junto a plumas quemadas de un ave. En pequeños grupos. **Época de fructificación.** Otoño.

**Comestibilidad.** Sin interés culinario.

**Observaciones.** Es una seta muy rara, de comportamiento pirófilo, y que tiene la particularidad, entre otras, de pertenecer a un pequeño grupo de *Coprinus* s.l. que tienen las esporas verrugosas. Estas verrugas son tan densas y prominentes, que al micro, la espora tiene la apariencia de una piña. Esta es una de las pocas citas que hay a nivel nacional.

Fecha publicación, 16 de Enero de 2012