



Foto. **Javier Zazo Ramos**. Texto. **Aurelio García Blanco**

Galeropsis desertorum var. bispora Valen. & Dvorak (Vasilkov) Moreno Heykoop & Illana

Sombrero: Cónico de 1,5-5 cm de altura, ápice obtuso y base de 0,2 –0,8 cm de anchura. Cutícula de color crema pardo, pasando después al amarillo pajizo, tendiendo a grisáceo al secarse, no deliquescente. El sombrero, tanto en fresco como en seco, aparece retorcido y con estrías finísimas longitudinales, producidas por las láminas. Margen delgado, retorcido y resquebrajado.

Láminas: De color pardo tabaco, permanecen ocultas durante largo tiempo, hasta que el sombrero se abre cuando tiene lugar su desintegración.

Pie: De 8 x 0,2 cm cilíndrico, recto o curvo, adherido fuertemente al ápice del sombrero, del color del píleo.

Carne: Escasísima, de color crema, después grisácea, de olor aromático y sabor no apreciable.

Esporas: Citriformes elipsoidales, con poro germinativo, de 15-24 x 8-13 μm . Ocráceas en masa.

Hábitat: Fructifica sobre estiércol de caballo y en eras o terrenos incultivados. En grupos numerosos, a veces unidos por la base. **Época de fructificación:** Otoño. Especie rarísima, con muy pocas citas a nivel europeo.

Comestibilidad. Sin interés.

Observaciones: Aunque no se trate de una novedad para la AVM, si es digno de que lo mencionemos aquí, ya que desde el año 1994, que lo localizamos por primera vez sobre estiércol de caballo, en una escuela de hípica de Valladolid, nunca más la habíamos vuelto a ver.

En esta ocasión, las fructificaciones aparecían en terreno incultivado, entre setas de cardo, y con una abundancia tal, que los autores pudimos contar varios cientos de ejemplares.

Fecha publicación. 19 de Enero de 2012.