



Foto. **Guillermo Martínez Fernández**. Texto. **Aurelio García Blanco**

Hohenbuehelia silvana (Sacc.) O.K. Mill.

Sinónimo. *Resupinatus silvanus* (Sacc.) Sing.

Sombrero. De 0,4-0,7 cm de diámetro, en forma de copa, de concha o de abanico, unido al substrato por el dorso o lateralmente. Margen recurvado. Cutícula gelatinosa, de color gris o gris casi negro, tomentosa a estrigosa al estar cubierta por una pilosidad blanquecina, no higrófana. **Láminas.** Situadas de forma radial confluyentes hacia un punto excéntrico cerca de la base, blancas, muy separadas. **Pie.** Inexistente. **Carne.** Muy escasa, gelatinizada, casi nula. **Olor.** Algo harinoso. **Sabor.** Suave farináceo.

Esporas. Cilíndrico-elipsoidales, de 6,5-9,5(11) x 4-5 μm , hialinas, lisas. Esporada blanca.

Hábitat. Fructifica sobre tallos viejos de cicuta, en momentos de mucha humedad. Aislada o en pequeños grupos. **Época de fructificación.** Hasta ahora la hemos localizado siempre en invierno. Muy rara y escasa.

Comestibilidad. Sin interés culinario.

Observaciones. Pasa desapercibida por su pequeño tamaño, que recuerda, a una especie del género *Resupinatus*.

Una especie con la que se confunde por su aspecto macroscópico es *H. cyphelliformis*, que presenta esporas alantoides. Para algunos autores serían sinónimos.

Fecha de publicación, 31 de Enero de 2012.