



Texto y foto. **Aurelio García Blanco**

***Lepiota griseovirens*** Maire in Bull.

**Sombrero.** De 1,2-3 cm de diámetro, de cónico-campaniforme a plano-convexo, umbonado. Margen excedente, blanquecino. Cutícula aterciopelada tomentosa, de color gris oscuro, marrón grisáceo o color oliva-grisáceo, con el centro más oscuro. **Láminas.** Libres, ventrudas y redondeadas cerca del pie, donde forma una especie de collar; blancas o algo cremosas, a veces con tonos grisáceos, y con la edad, se manchan de tonos pardo anaranjados. Arista finamente flocosa. **Pie.** De 20-60 x 2-5 mm, cilíndrico y más ancho en la base, fistuloso; en la parte media superior, liso, de color crema rosado y en la parte media inferior adornado de por bandas o por escamas muy dispersas de color gris-negro o gris-marrón; presentando en la base, una masa de cordones miceliales blancos. **Carne.** Blanquecino-grisácea, ligeramente rosada en el pie. **Olor.** Afrutado de joven, después a caucho. **Sabor.** Fuerte, desagradable.

**Esporas.** Cilíndricas, subtruncocónicas o subfusiformes, espolonadas lateralmente y con base truncada, de 6-10 x 3-4,5  $\mu\text{m}$ , lisas, dextrinoides. Esporada blanca.

**Hábitat.** En bosque mixto de pinos y encina, con suelos arenosos o limosos ricos en nutrientes. Gregaria. **Época de fructificación.** Otoño y principio de invierno. Muy rara.

**Comestibilidad.** Sospechosa de toxicidad.

**Observaciones.** Destaca por su coloración piléica y por la decoración llamativa en el pie, con escamas casi negras.

Fecha publicación, 27 de Enero de 2012