



Texto y foto. **Aurelio García Blanco**

Lepiota pseudohelveola Kühner

Sombrero. De 2-5 cm de diámetro, primero convexo, luego extendido, algo mamelonado. Cutícula de color pardo gris o pardo rosa, con la edad se decolora algo, con el centro más oscuro, casi negro, cubierta de escamas concéntricas de color beige. Margen, a veces, con restos del anillo.

Láminas. Libres, distantes, ventradas, blancas, con lamélulas.

Pie. De 3-6 x 0,3-0,5 cm, cilíndrico, ligeramente curvado en la parte inferior, de color crema o pardo crema en lo alto, más oscuro y con reflejos carne rosa en la base, donde presenta restos de micelio algodonoso blanquecino. **Anillo.** Muy vistoso, membranoso, evidente, de proyección oblicua, blanquecino en la parte superior y decorado en la parte externa e inferior con flocones de color pardo. **Carne.** Escasa, blanca, de color carne en el pie. **Olor.** Nulo o afrutado. **Sabor.** Indefinido.

Esporas. Elipsoidales a ovoides, de 7-10 x 4-5,5 μm , hialinas, lisas, dextrinoides. Esporada blanca.

Hábitat. Fructifica en bosques diversos, en el caso de este hallazgo lo hacía bajo *Pinus pinea*. En colonias. **Época de fructificación.** Otoño. Muy rara.

Comestibilidad. Venenosa MORTAL.

Observaciones. Especie muy próxima a *L. helveola*, que sin embargo es de mayor tamaño, la coloración del sombrero, en general, es de colores más rosáceos y presenta escamas vinosas, olor más intenso afrutado y sobre todo, su anillo no está situado de forma oblicua.

Fecha publicación, 9 de Enero de 2012