



Texto y foto. **Aurelio García Blanco**

Lepiota speciosa (Trimbach) Trimbach & Augias

Sombrero. De 1,3-3 cm de diámetro, al principio cónico, después convexo y finalmente plano convexo, ligeramente mamelonado. Margen curvado, ligeramente excedente. Cutícula aterciopelada, de color marrón vinoso, con el disco más oscuro, castaño-rojizo, disociándose hacia el margen y presentando una excoriación, a modo de dientes, muy llamativa, que no llega a tocar el margen, quedando ahí una franja evidente de color casi blanco. **Láminas.** Libres, blancas, anchas, desiguales. **Pie.** De 2-4 x 0'3-05 cm, blanquecino a vinoso-grisáceo, liso o finamente fibrilloso por encima de una zona pseudoanular más o menos marcada, por debajo, decorado con escamas punteadas de color rojo vinoso o como el del sombrero y con la base coloreada más intensamente, presentando rizoides con restos de substrato adheridos. **Anillo.** En forma de velo blanquecino, evanescente. **Carne.** Blanquecina rosácea, vinoso en la base del pie. **Olor.** Parecido al caucho. **Sabor.** Algo ácido.

Esporas. Elipsoidales a ligeramente ovoides, de 6-8 x 3'5-5 μm , lisas, dextrinoides. Esporada blanca.

Hábitat. En bosque de *Pinus pinea*, en zonas con abundancia de retamas. En colonias de numerosos ejemplares. **Época de fructificación.** Otoño y principios de invierno. Muy rara.

Comestibilidad. Posiblemente tóxica, incluso tóxica mortal.

Observaciones. Especie de difícil interpretación por su afinidad con *L. rhodorhiza*, que no presenta una coloración rojiza-vinosa, sus esporas son de menor tamaño, 5-7 x 3-4 μm y en la base del pie presenta rizoides pilosos muy abundantes y vistosos de color rojizo.

Fecha publicación, 27 de Enero de 2012