



Texto y foto. **Aurelio García Blanco**

Pluteus poliocnemis Kühner

Sombrero. De 2-5 cm de diámetro, semigloboso de joven, después convexo y finalmente, plano convexo. Margen liso, fino, algo irregular. Cutícula marrón muy oscura de joven, después marrón, con el centro más oscuro, cubierta toda ella por pequeñas escamas más oscuras, menos visibles con la edad. **Láminas.** Libres o algo adnatas por un diente, blancas durante un tiempo, después de color rosa, abundantes, con laminillas. **Pie.** De 2-5 x 0,3-0,5 cm, cilíndrico, recto o muy curvado según el lugar del tronco donde fructifiquen, blanco, cubierto por escamas marrón negruzcas, más densas de joven, después solo observables en la base. **Carne.** Escasa, blanca. **Olor.** Poco apreciable. **Sabor.** Sin interés.

Esporas. Largamente elipsoidales, de 8-11 x 5-6 μm , gris-rosa, lisas. Esporada rosada.

Hábitat. Sobre madera muerta, muy degradada, de chopo, cubierta por lodo del río. En grupos numerosos. **Época de fructificación.** Primavera. Muy raro y apenas citado.

Comestibilidad. Sin interés culinario.

Observaciones. Esta especie tiene la particularidad de presentar esporas largamente elipsoidales, algo poco habitual para este género, en el que abundan las especies con esporas casi globosas o anchamente elipsoidales.

